

Anti-Human CD3, APC-Cy7 (Clone: SK7) 检测试剂

【产品信息】

目录号: **F11003A06** 规格: 25T、100T
克隆号: SK7 亚型: Mouse IgG2a, κ
反应性: 人 纯化: 亲和层析 标记: APC-Cy7
储存液: 含 0.2% BSA 和 0.2% ProClin950 的磷酸盐缓冲液 (pH7.2)

【背景简介】

CD3也称为T3, 是免疫球蛋白超家族的一员, 在抗原识别、信号传导和T细胞活化中具有重要作用。CD3 ϵ 的分子量为20 kD, 是CD3分子的亚基, 后者由2个CD3 ϵ 、1个CD3 γ 、1个CD3 δ 和1个CD3 ζ (CD247)构成, 并与 α/β 或 γ/δ T细胞受体(TCR)形成异源二聚体。CD3表达于所有成熟T细胞、NKT细胞和部分胸腺细胞。本OKT3抗体也能够诱导T细胞活化。

【使用方法】

全血样本: 取100 μ L抗凝血, 加入5 μ L本产品和其他抗体, 震荡混匀, 于室温避光孵育15分钟或2~8 $^{\circ}$ C避光孵育30分钟。根据红细胞裂解液说明书进行操作, 去除红细胞。300 \times g 离心5~10分钟, 弃上清, 加入500 μ L流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

其他样本: 将 $10^5 \sim 10^8$ 个单细胞经适当离心后, 取适量流式染色缓冲液 (目录号 S1001)重悬, 加入5 μ L本产品和其他抗体, 使反应终体积为100 μ L。震荡混匀, 于室温避光孵育15分钟或2~8 $^{\circ}$ C避光孵育30分钟。每管加入1~2 mL流式染色缓冲液, 300 \times g 离心5~10分钟, 弃上清, 加入500 μ L流式染色缓冲液重悬, 上机检测。


实验中, 可对抗体进行优化滴定以获得最佳效果。

【储存条件及失效日期】

2~8 $^{\circ}$ C避光, 切勿冻存; 失效日期参见试剂盒标签;

【结果示例】

以 FSC/SSC 中的淋巴细胞设门进行分析的人外周血染色本产品的结果示例。



【注意事项】

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研, 不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康, 请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。

【基本信息】

生产厂家: 杭州联科生物技术股份有限公司
网站: www.liankebio.com 销售服务: info@liankebio.com
服务热线: 400 6721 600 技术支持: tech@liankebio.com
说明书版本: F11003A06-AT1

本产品仅用于科学研究, 不得用于临床诊断。