



## Anti-Human CD4, PerCP-Cy5.5 (Clone:SK3)检测试剂

### I. 产品信息

目录号: F11004A04	规格: 25T, 100T
保存: 2 - 8°C 避光, 切勿冻存	亚型: Mouse IgG1, $\kappa$
克隆号: SK3	用量: 5 $\mu$ l/test
推荐应用: 流式	标记: PerCP-Cy5.5
反应性: 人	纯化: 亲和层析
储存液: 含 0.2% BSA 和 0.2% proclin 950 的磷酸盐缓冲液(pH7.2)	

### II. 背景简介

CD4 也称为 T4, 为 55 kD 的单链 I 型跨膜糖蛋白, 表达于大部分胸腺细胞、T 细胞亚群和单核/巨噬细胞。CD4 作为免疫球蛋白超家族的一员, 可识别与 MHC II 类分子结合的抗原, 参与细胞-细胞互作、胸腺分化和信号传导。CD4 是 HIV 的主要受体, 可与 HIV gp120 结合。CD4 与 IL-16 也有相互作用。

### III. 使用方法

**全血样本:** 取 100  $\mu$ l 抗凝血, 加入 5  $\mu$ l Anti-Human CD4, PerCP-Cy5.5 和其他抗体, 震荡混匀, 于室温避光孵育 15 分钟或 2 - 8°C 避光孵育 30 分钟。根据红细胞裂解液说明书进行操作, 去除红细胞。300 $\times$ g 离心 5-10 分钟, 弃上清, 加入 500  $\mu$ l 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

**其他样本:** 将  $1 \times 10^5 - 10^8$  个单细胞经适当离心后, 取适量流式染色缓冲液 (目录号 S1001)重悬, 加入 5  $\mu$ l Anti-Human CD4, PerCP-Cy5.5 和其他抗体, 使反应终体积为 100  $\mu$ l。震荡混匀, 于室温避光孵育 15 分钟或 2 - 8°C 避光孵育 30 分钟。每管加入 1 - 2 ml 流式染色缓冲液, 300  $\times$  g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500  $\mu$ l 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

实验中, 可对抗体进行优化滴定以获得最佳效果。

### IV. 结果示例




图. 人外周血染色 Anti-Human CD4, PerCP-Cy5.5 (F11004A04)和 Anti-Human CD8 $\alpha$ , FITC (F11008B01)的结果。以 FSC/SSC 中的淋巴细胞设门进行分析。



## V. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研，不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
3. 更多流式相关产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。