



Anti-Human CD19, PerCP-Cy5.5 (Clone: SJ25C1) 检测试剂

I. 产品信息

目录号: F1101904/2	规格: 25T, 100T
保存: 2 - 8℃ 避光, 切勿冻存	亚型: Mouse IgG1, κ
克隆号: SJ25C1	用量: 5 μl /test
推荐应用: 流式	标记: PerCP-Cy5.5
反应性: 人	纯化: 亲和层析
储存液: 含 0.2% BSA 和 0.2% proclin 950 的磷酸盐缓冲液(pH7.2)	

II. 背景简介

CD19 也称为 B4, 是分子量为 95kDa 的 I 型跨膜糖蛋白。除了浆细胞和滤泡树突细胞, 它表达于所有发育阶段的 B 细胞。CD19 在 B 细胞增殖、活化和分化中发挥作用, 可作为 BCR 共受体与 CD21 和 CD81 作用。它是 B 细胞发育和淋巴瘤诊断的生物标志, 可用于白血病免疫治疗的靶标。

III. 使用方法

全血样本: 取 100 μl 抗凝血, 加入 5 μl Anti-Human CD19, PerCP-Cy5.5 和其他抗体, 震荡混匀, 于室温避光孵育 15 分钟或 2 - 8℃ 避光孵育 30 分钟。根据红细胞裂解液说明书进行操作, 去除红细胞。300×g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500 μl 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

其他样本: 将 $1 \times 10^5 - 10^8$ 个单细胞经适当离心后, 取适量流式染色缓冲液 (目录号 S1001) 重悬, 加入 5 μl Anti-Human CD19, PerCP-Cy5.5 和其他抗体, 使反应终体积为 100 μl。震荡混匀, 于室温避光孵育 15 分钟或 2 - 8℃ 避光孵育 30 分钟。每管加入 1 - 2 ml 流式染色缓冲液, 300 × g 离心 5 - 10 分钟, 弃上清, 加入 500 μl 流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

实验中, 可对抗体进行优化滴定以获得最佳效果。

IV. 结果示例




图. 人外周血染色 Anti-Human CD19, PerCP-Cy5.5 (F1101904/2) 的结果。
以 FSC/SSC 中的淋巴细胞设门进行分析。



V. 注意事项

1. 请在使用本产品前仔细阅读说明书。本产品仅用于科研，不可用于诊断。
2. 为了您的安全和健康，请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。
3. 更多流式相关产品敬请关注联科生物网站或来电咨询。