

Anti-Human CD45, mFluor 450 (Clone: HI30) 检测试剂

【产品信息】

目录号: **F11045A07** 规格: 25T、100T
克隆号: HI30 亚型: Mouse IgG1,k
反应性: 人 纯化: 亲和层析 标记: mFluor 450
储存液: 含0.2% BSA和 0.2%ProClin950的磷酸盐缓冲液(pH7.2)

【背景简介】

CD45 也被称为白细胞共同抗原(leukocyte common antigen, LCA), 由一类结构相似, 分子量较大(180 kDa、190 kDa、205 kDa 和 200 kDa)的跨膜蛋白组成, 广泛存在于所有白细胞表面(包括淋巴细胞、粒细胞和单核细胞), 但不表达于成熟的红细胞、血小板、骨髓中的成熟红系细胞以及非造血组织。CD45 胞浆区段具有 蛋白质酪氨酸磷酸酶的作用, 能使底物 P56lck 和 P59fyn 上酪氨酸脱磷酸而激活, 在细胞的信息传导中发挥重要作用, CD45 是细胞膜上信号传导的关键分子, 在淋巴细胞的发育成熟, 功能调节及信号传递中具有重要意义。CD45 的分布可 作为某些 T 细胞亚群的分类标志。

【使用方法】

全血样本: 取100 μ L抗凝血, 加入5 μ L本产品和其他抗体, 震荡混匀, 于室温避光孵育15 分钟或2~8 $^{\circ}$ C避光孵育30 分钟。根据红细胞裂解液说明书进行操作, 去除红细胞。300 $\times$ g 离心 5~10 分钟, 弃上清, 加入500 μ L流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

其他样本: 将 $1 \times 10^5 \sim 10^8$ 个单细胞经适当离心后, 取适量流式染色缓冲液(目录号 S1001)重悬, 加入5 μ L本产品和其他抗体, 使反应终体积为100 μ L。震荡混匀, 于室温避光孵育15 分钟或 2~8 $^{\circ}$ C 避光孵育30分钟。每管加入1~2 mL流式染色缓冲液, 300 $\times$ g 离心 5~10分钟, 弃上清, 加入500 μ L流式染色缓冲液重悬, 上机检测。

本产品仅用于科学研究, 不得用于临床诊断。


实验中, 可对抗体进行优化滴定以获得最佳效果。

【储存条件及失效日期】

2~8 $^{\circ}$ C避光, 切勿冻存; 失效日期参见试剂盒标签;

【结果示例】

以人外周血细胞进行分析人外周血染色本产品测试结果示例。



【注意事项】

1. 请在 使用本产品前仔细阅读说明书。 **本产品仅用于科研, 不可用于诊断。**
2. 为了您的安全和健康, 请穿戴实验防护服、手套、口罩等必要的防护装备。

【基本信息】

生产厂家: 杭州联科生物技术股份有限公司

网站: www.liankebio.com 销售服务: info@liankebio.com

服务热线: 400 6721 600 技术支持: tech@liankebio.com

说明书版本: F11045A07-AT1